# PERTE AUDITIVE LÉGÈRE

## - LÉGÈRE PEUT-ÊTRE, MAIS NON NÉGLIGEABLE

Saviez-vous que la perte d'audition chez l'adulte est considérée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme la troisième cause de handicap, la déficience auditive légère étant la forme la plus fréquente? D'après les estimations de l'OMS, une personne de plus de 65 ans sur trois en Amérique du Nord souffre d'une perte auditive légère. Quelles sont les conséquences d'une perte auditive légère et que pouvez-vous faire?

Pour certains, une perte légère cause une invalidité importante dans la vie quotidienne en ce qui a trait au langage et à la communication, et elle augmente la fatigue liée à l'écoute.



Une déficience auditive légère peut entraîner une réduction du mieux-être émotionnel.<sup>5</sup>





Une perte auditive neurosensorielle non traitée a des effets sur les relations interpersonnelles et les interactions sociales, et diminue la qualité de vie.<sup>6</sup>



Les conséquences d'une perte auditive légère ne sont pas anodines. La perte auditive légère vient presque tripler le risque de chute<sup>2</sup>, et est associée à un risque de démence deux fois plus élevé en comparaison avec les personnes ayant une audition normale.<sup>3</sup>

L'une des raisons de déconseiller les aides auditives pour une perte légère pourrait être que celles-ci sont perçues comme moins utiles pour les personnes ayant une déficience auditive légère, alors que plusieurs études ont démontré le contraire.7



#### Bureau de Montréal

3035, boul Langelier Montréal (Québec) H1N 3A5 T. 514 254.4113

#### Bureau de Repentigny

406, rue Notre-Dame Repentigny (Québec) J6A 2T1 T. 450 654.9784



 $sophie.gagnon@bellnet.ca \cdot www.sophiegagnon.com$ 

### Bureau de Montréal 3035, boul Langelier

Montréal (Québec) H1N 3A5 T. 514 254.4113 Bureau de Repentigny

406, rue Notre-Dame Repentigny (Québec) J6A 2T1

T. 450 654.9784



sophie.gagnon@bellnet.ca · www.sophiegagnon.com

#### **RÉFÉRENCES:**

1 Timmer B. Hearing Review. 2014; 21(4):30-33 | 2 Lin FR et al. Arch Intern Med. 2012; 172(4): 369-371 | 3 Lin FR et al. Arch Neurol. 2011; 68(2):214–220 | 4 Moller KN et al. What are Some Common Misconceptions of Mild Hearing Loss? https://www.audiologyonline.com/ask-the-experts/what-some-common-misconceptions-mild-12268 | 5 Bertoli et al. Intl J Audio. 2010; 49:5, 333-346 | 6 Chisolm TH et al. J Am Acad Audiol. 2007; 18(2):151–183 | 7 Davis et al. Health Technol Assess. 2007; 11(42):1-294; Dillon H. Hearing Loss: The Silent Epidemic. 17th National Conference of the Audiological Society of Australia. Perth, Australia; 2006.